© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Ostrea edulis, L. & vrs. Oc. germanicus & M. med.	0,30-50	Zizyphinus depictus, Dsh. M. med.	0,15
„ Stentiana, Payr. et alteri M. med.	0,30-50	Litorina punctata, Gmel. M. med.	0,10-15
Mytilus minutissimus, Poli M. med.	0,15	*Rissoa* albella, Lov. Anglia	0,10-15
Modiola Petagnae, Scacc. „	0,25	arenaria, Mi & Ad. Terra nova	0,10-15
Bornia corbuloides, Phil. „	0,45	auriscalpium, L. M. med.	0,5-10
Lucina divaricata, L. „	0,35	algeriana, Monteros. Algeria	0,20-25
Woodia digitaria, L. „	0,45	„ v. rufula „	0,30-40
Isocardia cor., L. „	1—2	Barbati, Perier Panama	0,15-20
Cardium papillosum, Poli, et alteri M. med.	0,20-30	Beaunii, Hanl. Pontebianche	0,15-20
Cardita calyculata, L. et alteri M. med.	0,35	calathiscus, Laskey Adria	0,5-10
Chama gryphoides, L. „	0,45	cancellata, Da Cos. Ins. norm.	0,5-10
Artemis lupinus, Poli „	0,30	„ v. minor. (subcrenulata, Schm.) Ins. norm.	0,5-10
Tapes aureus, Gmel. & var. bicolor M. med.	0,25	caribaea, D'Orb. Algeria	0,40-50
Tapes geographicus, L. & var. saxicola M. med.	0,25	†cimicoides, Forb. Norvegia	0,10-15
Tellina cumana, Costa „	0,25-35	cimex, Brocc. M. med.	0,5-10
pulchella, Lm. „	0,30-35	„ v. depauperata Alg.	0,10-15
incarnata, Poli „	0,25-35	cingillus Mntg. & vars. Angl. & Hibern.	0,5-10
serrata, Brocchi „	0,80	„ v. rupestris Anglia	0,10-15
Donax semistriatus, Poli „	0,20	costata, Adms. Ins. norm.	0,5-10
Mactra corallina, L. „	0,30-40	costulata, Alder Cornwall & M. med.	0,10-15
Dentalium rubescens, Desh. M. med.	0,25-30	Desmaresti, Recl. (? splendida v.) Adria	0,10-15
Dentalium rubescens, var. albidum M. med.	0,30-40	dictyophora, Phil. Algeria	0,10-15
Dischides bifissus, Wood „	0,20	europaea, Risso. (? = variabilis, Mühlf.) M. med.	0,5-10
Gibbula Drepanensis, Brug. M. med.	0,50	fulgida, Adms. Cornwall	0,5-10
„ Racketi, Payr. „	0,25	glabrata, Auct. Alger.	0,20-25
		granulata, Phil. (? = cancellata, Da Cos.) M. med.	0,5-10
		inconspicua, Alder Angl.	0,5-10

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
†Jeffreysi, Waller Magerö	0,10-15	striatula, Mntg. Ins. norm.	0,10-15
lactea, Mich. Adria	0,10-15	variabilis, Mühlf. M. med.	0,5-10
Lanciae, Calc. M. med.	0,5-10	ventricosa, Desm. & v. striata M. med.	0,5-10
lineata, Risso Algeria	0,5-10	violacea, Desm. M. m. etc.	0,5-10
Marginata, Mich. Provence	0,10-15	„ v. porifera Angl.	0,10-15
Mariae, Hörnes M. med.	0,10-15	vitrea, Mntg. Alg. & „	0,30-40
membranacea, Adms. „	0,5-10	zetlandica, Mtg. Norv. etc.	0,15-25
„ v. elongata Toscana	0,5-10	Rissoina Bruguieri Payr. M. med.	0,5-10
„ v. ventricosa M. med.	0,5-10	Peringiella levis, Monteros. Algeria	0,20-30
„ v. baltica Wiesmar	0,5-10	Truncat. truncatula, L. Angl.	0,5-10
monodonta, Biv. M. med.	0,5-10	„ v. levigata „	0,15-20
Montagui, Payr. „	0,5-10	Scalaria pseudoscalaris, Br. Algeria	035-,45
mucronata, Mor. (? = costulata, Ris.) M. med.	0,5-10	*Bela*	
obscura, Phil. „	0,5-10	exarata, Mtg. Vadsö	0,30-50
octona, L. Baltic	0,10-15	secalina, Phil. Algeria	0,30-40
parva, Da Costa Cornwall	0,5-10	†septangularis, Phil. Angl. & M. med.	0,20-30
„ v. interrupta, Ad. „	0,5-10	†tenuicostata, Sars Norv. occ.	0,50
„ v. exilis, Jeff. „	0,5-10	Trevelyana, Turt. Norveg. occ. & Angl.	0,40
„ v. minima & maxima „	0,5-10	turricula, Mntg. Island	0,20-30
„ nigra-albocostata „	0,10-15	„ v. tenuicostata Hibern.	0,30-40
punctura, Mntg. Angl.	0,5-10	„ v. nobilis & rosea Finm.	0,40
pusilla, Phil. Algeria	0,10-15	*Mangelia*	
radiata, Hanl. „	0,10-15	costata, Don. Anglia	0,20-30
„ v. levigata „	0,10-15	Stosiciana, Brus. Algeria	0,35-40
reticulata, Mntg. Angl.	0,5-10	paciniana, Calca. „	0,20-30
rudis, Phil. Algeria	0,5-10	„ v. levis Cannes	0,20
„ v. rufa „	0,10-15	rugulosa, Phil. Algeria	0,25-30
saturata, Frnfld. Adria	0,10-15	„ v. albida, Dsh. „	0,30-40
saxatilis, Möll. Finmarkia	0,10-15	„ v. lineata, Aucts. „	0,30-45
semistriata, Mntg. Angl. & M. med.	0,5-10	taeniata, Dsh. M. med.	0,30-40
seminulum, Monteros. Alger.	0,25-30	Vauquelini, Payr. „	0,30-40
similis, Scacc. „	0,5-10	*Raphitoma*	
„ v. levis „	0,5-10	brachystoma, Phl. „	0,30-40
„ v. ecostata „	0,10-15		
soluta, Phil. Anglia	0,5-10		
splendida, Eichw. Adria	0,15-20		
striata, Adms. & v. arct. Norv.	0,5-10		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
multinineata, Dsh. M. med.	0,30-40	pusillum, Jeffr.' Algeria	0,10-15
nebula, Mntg. Anglia	0,25-30	lacteum, Phil. „	0,10-15
„ v. ginnaniana, Sca. M. m.	0,30-40	*Cerithiopsis*	
„ v. levigata, Phil. Alg.	0,30-40	minima, Brus. „	0,15-20
Defrancia		metaxae, Delle Chia „	0,20-40
anceps, Eichw. (teres, Forb.) Shetl.	0,40-50	Trophon pulchellus, Phl. „	0,40-50
gracilis, Mtg. Hib.& M. med.	0,60-1	*Nassa*	
linearis, Mtg.&var. Angl.& „	0,20-30	pygmaea, Lam. Algeria	0,20-25
Philberti, Mich. Algeria	0,30-40	Cuvieri, Payr. „	0,15-20
purpurea, Mntg. M. med.	0,40-50	„ v. minor levis „	0,15-20
Auriculina Erjaveci, Brus. Algeria	0,20	„ v. minor globosa „	0,15-20
Pyrgulina		„ v. atra „	0,20-30
excavata, Phil. „	0,20	granum, Lm. „	0,15-20
monozona, Brus. „	0,20	incrassata Müll. „	0,10-15
fenestrata, Forbes Anglia	0,25	mutabilis, L. „	0,20
scalaris, Phil. Algeria	0,20	reticulata, L. „	0,15-30
tricincta, Jeffr. „	0,20-30	*Cylichna*	
Turbonilla		Jeffreysi, Weink. „	0,20-30
pusilla, Phil. „	0,15	striatula, Forbes „	0,15-25
delicata, Monteros. „	0,20	umbilicata, Mntg. „	0,15-20
striatula, Aucts. „	0,15	Untriculus minutissimus, Mart. Algeria	0,15
Eulimella acicula, Dsh. „	0,20	Aplysia fasciata, Poiret „	0,50-60
Eulima distorta, Phil. „	0,15-20	„ Cuvieri, Delhe Chia „	0,30-40
„ „ v. gracilis „	0,15-20	Siphonaria Algira Q. & G. Algeria	0,10-15
„ intermedia, Cantr. „	0,10-20	*Triton*	
Natica intricata, Don. „	0,40-50	corrugatus, Lm. Napoli	1—2
„ hebraea, Mart. „	0,50	parthenopeus, v. Salis Palermo	2,50-60
Cancellaria cancellata, L. „	0,70-1	Pandora inequivalvis, L. Napoli	0,25-40
„ „ v. lactea „	0,60-1	Pholas candida, L. „	0,30-50
Cerithium			
rupestre, Risso Algeria	0,10-15		

Helix. Dr. Kobelt's collectio, in parte.

carseolana, Fér. var.	Terni, Roma	0,20-25
cingulata, Stud. v. carrarensis, Porro	Carrara	0.20-25
globularis, Zgl.	S. Maria di Gesú. Palermo	0,20-30
„ var. picta	Parco. „	0,20-30
„ v. crispata	Monreale. Palermo	0,20-30
„ v. saracena	S. Ciro. „	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
macrostoma, Mühlf.	M. pelegrino. Palermo	0,30-40
Martensiana, Tiberi	Pietra roja. Samnium	0,15-20
mazzulli, Jan.	Sferacavalea. Palermo	0,30-40
muralis, Müll. v. undulata	via dei Capucini. „	0,20-25
nebrodensis, Pirajno	Castel buono. Sicilien	0,20-25
„ v. fasciata	„ „	0,20-25
Paciniana, Phil.	Segesta. „	0,20-25
„ var. major	Calatafimi. „	0,20-25
platychela, Mnke.	Torre di Momo. Palermo	0,20-25
„ „ var.	Bediemi. „	0,20-25
Raspaili, Payr.	Corsica.	0,60-80
scabriuscula, Dsh.	Trapani. Sicil.	0,20-30
„ v. major	„	0,20-30
sicana, Fér. & v. minor	Mte. pelegrino. Palermo	0,20-25
signata, Fér. rara	Mte. casino. Napoli	0,30-50
surrentina, A. Schm.	Sorrento	0,20-25
vermiculata, Müll. var.	Palermo	0,20-25
„ v. minor	Gallia merid.	0,15-20

Kleinere Mittheilungen.

(**Ein Schneckenfeind.**) Anfang Januar d. J. wurde in dem Rheinwalde, etwa 3 Km. von Strassburg, eine Fasanenhenne erlegt, deren Kropf 145 Gehäuseschnecken enthielt, die offenbar kurz vorher unter der Laubdecke hervorgesucht und verschluckt worden waren. Unter den mir von diesen Schnecken zur Untersuchung zugesandten 105 gut erhaltenen Exemplaren verschiedenen Alters befanden sich:

51 Helix arbustorum, L., darunter 1 lebend
38 „ incarnata, Müll. „ 3 „
15 „ villosa, Drap. „ 1 „
1 „ fruticum, Müll. (gebändert) darunter 1 lebend.

H. incarnata und villosa waren zum grössten Theil völlig ausgewachsen, unter den H. arbustorum befanden sich mehrere Exemplare von circa 18 mm. Breite und 12 mm. Höhe, auch die schön gebänderte H. fruticum hatte dieselbe Grösse. H. v. Heimburg.

Mittheilungen und Anfragen.

Der Unterzeichnete hat die Berichterstattung über lebende und fossile Mollusken für den Zoologischen Jahresbericht von Carus (Zoolog. Station in Neapel) übernommen und bittet alle Malacozoologen und Paläontologen, ihn durch Zusendung von Separatabzügen etc. zu unterstützen.

Schwanheim bei Frankfurt a. M. Dr. W. Kobelt.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Alt & Neumann in Frankfurt a. M.